CE 2265

2X

PROSTROLANE

dermal filler

Inner-B 2 ml

Inner-B SE 2 ml

English
Spanish
Italiano
German
French

Manufactured by Caregen Co., Ltd.
46-38 Cheogan Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongtan-gu, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 14119 South Korea
TEL +82-31-420-9200
Fax +82-31-462-3899
www.caregen.co.kr
e-mail: sales@caregen.com

EC REP
Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM

Tel: + (32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

English

Description
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** are a transparent gel supplied in a glass syringe. The product is for single use only. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** are sterile medical device, dermal resorbable implant that contains a non-cross-linked Sodium Hyaluronate and peptide complex(Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11).
Sodium Hyaluronate is a physiological origin and biocompatibility material. The role of Sodium Hyaluronate in the skin is to deliver peptide, to hydrate the skin by holding in water and to act as a cushioning agent.
Peptide complex consists of 4 Kinds peptides that short chain of amino acids linked by peptide bonds. The role of the peptide complex is to enhance the moisturizing effect, to improve the skin elasticity, to tighten skin and to delay the degradation of Sodium Hyaluronate.
Sodium Hyaluronate with peptide complex is degradable within 4 weeks. Each carton contains two traceability labels and 2x1 prefilled syringe.(3ml Prostrolane Inner_B or 1ml Prostrolane Inner_B®). Ione to be given to the patient, and another to be kept by the doctor in the patient's file)

Composition
PBS (Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%), Peptide complex (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11)

Intended purpose
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** is indicated for the treatment of subcutaneous fat,or damaged caused by chemical, physical and traumatic effects, such as softening of dermal surface irregularities, specifically formulated for suppressing cellulite skin.

- Site of Application
Face, abdomen, buttocks, back of the thighs
- Recommended dosage volume
Face: 4ml / area (Maximum : 12ml / area)
Abdomen, buttocks, back of the thighs : 10ml / area
(Maximum : 20ml / area)
- Frequency
1 session / 2 weeks (1 protocol = 4~6 sessions average)
(repeat protocol as necessary)

Treatment procedure
Pretreatment Guidelines
Prior to treatment, the patient should avoid taking aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory medications, St. John's Wort, or high doses of Vitamin C supplements. These agents may increase bruising and bleeding at the treatment site.

1. It is necessary to counsel the patient and discuss the appropriate indication, risks, benefits and expected responses to the Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** treatment. Advise the patient of the necessary precautions before commencing the procedure.
2. Assess the patient's need for appropriate anesthetic treatment by managing control, i.e., topical anesthetic, local or nerve block.
3. Wash the treatment area with soap and water, rinse well, pat dry and dried with a clean towel. Cleanse the area to be treated with alcohol or another suitable antiseptic solution.
4. Sterile gloves are recommended while using Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**.
5. Before treatment, press rod carefully until a small droplet is visible at the tip.
6. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** are administered using a thin gauge needle (27G x 13mm or 30G x 13mm) that is sterilized. The sterilized needle is inserted at an approximate angle of 90 degrees to the length of the injected site. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** should be injected into deep in the dermis.
7. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** are injected too superficially this may result in visible lumps and/or bluish discoloration.
8. Inject Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** slowly. With pressure on the plunger rod, it is important that the injection is stopped just before the needle is pulled out of the skin to prevent resultate from leaking out or ending up too superficially in the skin.
9. Only correct to 100% of the desired volume effect.
Do not overcorrect. With cutaneous deformities the best results are obtained if the defect can be manually stretched to the proper contour and then injected. The exact amount of filler for correction depend on the character of the defect treated.
9. Typical usage for each treatment session is specific to the site as well as varies widely. Or to apply on the dilated skin surface, to wait for full absorption.
10. After treatment, stick the traceability label on the patient's medical record.

Direction For Assembly
Assembly of 27G or 30G (Hypodermic needles) needle to syringe. For safe use of Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**, it is important that the needle is properly assembled. Improper assembly may result in separation of the needle and syringe during injection.

(1) Unscrew the tip cap of the syringe carefully. (A)
(2) Grasp the narrow part of the needle shield loosely; mount the needle on the Luer-Lock (B) by turning it clockwise until you feel counter-pressure. Grasp the wider part of the needle shield firmly.
(3) Press and turn the needle shield 90° (a quarter turn). The needle is not necessary to lock the needle onto the syringe.
(4) Pull off the needle shield.
(5) Use the thumb and forefinger to hold firmly around both the glass syringe barrel and the Luer-Lock adapter. Grasp the needle shield with the other hand. To facilitate *proper assembly*, both push and rotate firmly.

Contraindications
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** must not be used:
- for the combination with peeling, laser treatment or ultra-sound,
- if the patient has cutaneous disorder, inflammation or infection at the treatment site or near to this site,
- In the case of patients have a known hypersensitivity to any component, or with a history of severe allergy or anaphylactic shock,
- In case of the patients with autoimmune diseases,
- Due to possible interactions with other filling implants, which have not been researched, it is inadvisable to use Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** into sites in the presence of other filling implants.
- In pregnancy, breast-feeding mother, and in children or minors under 18 ages,
- for patients with bleeding disorders, skin color disorders.

Warnings and Adverse Events
• Avoid applying on skin products other than those advised by doctor
• The doctor must inform the patient of possible local reactions related to the implantation of this resorbable device.
• Should any inflammatory reaction or any other side effect not disappear within a week, the patient must inform the clinician about it immediately.
• The doctor is requested to report any notable side effect related to the Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** to Caregen Co., Ltd.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** is supplied in 27G or 30G needle. The use of the needle smaller than 30G is not advised as it is more difficult to inject the product. This process (Skin injection) such as cysts, pimples, rashes, or hives) or infection is present until the process has been controlled.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** are packaged for single patient use. Do not re-sterilize. Do not use if package is opened or damaged.
• Do not use Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** after the expiry date printed on the package.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** should not be mixed with other products before implantation of the device.Patients should be informed of possible adverse events such as infection, pain, UV lamp exposure and extreme cold weather at least until any initial swelling and redness resolved.
• After use, syringes and needles should be handled as potential biohazards. Disposal should be in accordance with accepted medical practice and applicable local, national requirements.

Storage condition
Store between 2 °C ~ 25 °C. Protect from freezing and sunlight. Make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use.

Shelf life
2 years under recommended conditions.

Spanish

Descripción
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** son gel transparente suministrado en jeringa de cristal. Esta producto es de un solo uso. Prostrolane Inner_B es un producto sanitario estéril, un implante dérmico reabsorbible que contiene Hialuronato Sódico no reticulado y un complejo de péptidos (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41,Octapeptide-11). El Hialuronato Sódico es un material biocompatible de origen fisiológico. El papel del Hialuronato Sódico es llenar en la piel el complejo de péptidos, hidratar la piel captando agua, y actuar como agente protector. El complejo de péptidos consiste en 4 tipos de péptidos de cadena corta de enlace dobles unidos por enlaces peptídicos. La función del complejo de péptidos es favorecer el efecto hidratante, mejorar el aspecto de la elasticidad y retrasar la degradación del Hialuronato Sódico. El complejo de péptidos con Hialuronato Sódico se degrada cuanto 4 semanas. Cada caja contiene 2 etiquetas de trazabilidad y 2x1 jeringa precargada (Prostrolane Inner_B o 1ml Prostrolane Inner_B®) y dos etiquetas de trazabilidad. Una para entregar al paciente, y otra para guardar junto con la ficha de paciente)

Composición
PBS (Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%), Peptide complex (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11)

Propósito previsto
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** está indicado para el tratamiento del daño del tejido subcutáneo causado por efectos químicos, físicos y traumáticos, como el ablandamiento de las irregularidades de la superficie dérmica, formulado específicamente para suprimir la piel de la celulitis.

- Área de aplicación
Cara, abdomen, nalgas, parte posterior de los muslos.
- Volumen recomendado: Cara : 4 ml/ área
(Máximo: 12ml/área) Abdomen, nalgas, parte trasera de los muslos :10ml / área (Máximo: 20ml/ área)
- Frecuencia : 1 Sesión/ 2 semanas (1 Protocolo = 4-6 Sesiones) (repetir protocolo si fuera necesario)

Procedimiento.
Directrices de pretratamiento
Antes del tratamiento, el paciente debe evitar tomar aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, hierba de San Juan, o altas dosis de suplementos de vitamina E. Estos agentes pueden aumentar los hematomas y sangrado en el área de tratamiento.

1. Es necesario to aconsejar al paciente y comentar las indicaciones, riesgos, beneficios y respuestas esperadas al tratamiento con Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**. Aconsejar al paciente de la necesidad de tomar precauciones antes de comenzar el procedimiento.
2. Evaluar la necesidad del paciente de un tratamiento anestésico apropiado para el control de la comodidad, es decir, anestesia tópica, local o bloqueo nervioso.
3. La zona del paciente debe lavarse con agua y jabón y secarse con una toalla limpia. Limpie el área a tratar con alcohol o Solución antiséptica.
4. Se recomienda el uso de guantes estériles mientras usa Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**.
5. Antes del tratamiento, presione la varilla con cuidado hasta que una pequeña gota sea visible en la punta.
6. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** se administra con una aguja de calibre fino (27G x 13mm o 30G x 13mm) que esta esterilizada. La aguja esterilizada se inserta en un ángulo aproximado de 90 grados a la longitud del sitio inyectado. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** debe inyectarse profundamente en la dermis.
7. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** se inyecta demasiado superficial, esto puede resultar en bultos visibles y / o decoloración azulada.
8. Inyectar Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** aplicando presión uniforme sobre el émbolo. Es importante que la inyección se detenga justo antes de sacar la aguja de la piel para evitar que el material se filtre fuera o termine demasiado superficialmente en la piel.
9. Solo corrija hasta el 100% del efecto de volumen deseado. No sobre corregir. Con deformidades cutáneas, los mejores resultados se obtienen si el defecto se puede estirar manualmente hasta el contorno deseado e inyectado. El grado y la duración de la corrección dependen del carácter del defecto tratado.
9. La dosis típica de cada sesión de tratamiento es específico del sitio así como la severidad de las arrugas.
10. Después del tratamiento, pegue la etiqueta de trazabilidad en el historial médico.

Instrucciones de montaje
Montaje de aguja 27G o 30G Aguja Hipodérmica) a la jeringa. Para un uso seguro de Prostrolane Inner_B, es importante que la aguja este correctamente ajustada. El ajuste incorrecto puede causar separación de la aguja y jeringa durante la inyección.



(1) Desenrosque la tapa de la jeringa cuidadosamente.
(2) Sujete la parte estrecha del protector de la aguja sin apretarlo; montar la aguja en el Luer-Lock (B) girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se sienta compresión. Sujete firmemente la parte más ancha del protector de la aguja.
(3) Presione y gire el protector de la aguja 90° (un cuarto de vuelta). Durante el cuarto de vuelta es necesario bloquear la aguja en la jeringa.
(4) Retire el protector de la aguja.
(5) Use el pulgar y el índice para sostener firmemente alrededor de la jeringa de vidrio y el adaptador Luer-Lock. Agarre la aguja de la aguja con la otra mano. Para facilitar el ensamblaje adecuado, empuje empuje y gire con firmeza.

Contraindicaciones
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** no debe ser utilizado:
- para la combinación con peeling, tratamiento con láser o ultrasonido,
- si el paciente tiene un trastorno cutáneo, inflamación o infección en el área de tratamiento o cerca de esta,
- en el caso de los pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico, con antecedentes de alergia grave o choque anafiláctico,
- en el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes,
- Debido a posibles interacciones con otros implantes de relleno, que no se han investigado, no es aconsejable usar Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** en áreas en presencia de otros implantes de relleno.
- en embarazo, madre lactante, y en niños o menores de 18 años,
- para pacientes con trastornos hemorrágicos, trastornos del color de la piel.

Advertencias y Eventos adversos
• Evite aplicar productos para la piel que no sean los recomendados por el médico
• El médico debe informar al paciente de las posibles reacciones locales relacionadas con la implantación de este dispositivo reabsorbible.
• En caso de que la reacción inflamatoria o cualquier otro efecto secundario no desaparezca en una semana, el paciente debe informar al médico de inmediato.
• Se le solicita al médico que informe cualquier efecto secundario relevante con Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** a Caregen Co., Ltd.
• Inner_B a través de la página web, www.caregen.co.kr o por correo a: 82-31-462-3899
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** son esterilizados con aguja y jeringa de 27G o 30G. El uso de agujas más pequeñas no se aconseja ya que es más difícil inyectar el producto. Este proceso (Inyección de la piel como quistes, granos, erupciones cutáneas o urticaria) o haya infección presente hasta que el proceso haya sido controlado.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** están empaquetados para uso en un solo paciente. No volver a esterilizar. No lo use si el paquete está abierto o dañado.
• No use Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** después de la fecha de caducidad impresa en el paquete.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** no debe mezclarse con otros productos antes de la implantación del dispositivo.
• No inyectar en vasos sanguíneos.
• No inyectar en pérgolas cutáneas.

Precauciones
• En caso de riesgo alérgico, se debe realizar una prueba antes de la primera inyección. Los resultados de la prueba se deben adjuntar al historial médico.
• Se informa a los pacientes que pueden experimentar algunos efectos secundarios, como hinchazón, enrojecimiento, picazón, sangrado, hematomas o decoloración temporal en el área de inyección. Estos efectos secundarios generalmente son de naturaleza leve a moderada y suelen desaparecer en una semana.
• Evitar el uso de productos tópicos irritantes o abrasivos en el área de inyección.
• Evitar el contacto con fuentes de calor excesivo, como saunas, solárium, duchas calientes, etc. durante 24 horas después del tratamiento.
• Evitar el ejercicio físico extenuante durante 24 horas después del tratamiento.
• Evite la exposición a la luz ultravioleta durante 24 horas después del tratamiento.
• Evite el maquillaje durante 24 horas después del tratamiento.
• Evite el contacto con el área tratada durante 24 horas después del tratamiento.
• Evite el uso de productos para la piel que no sean los recomendados por el médico durante 24 horas después del tratamiento.
• Evite el uso de productos para la piel que no sean los recomendados por el médico durante 24 horas después del tratamiento.

Indicaciones por il montaggio
Assemblaggio dell'ago 27G o 30G (ago ipodermico) alla siringa. Per un uso sicuro di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**, è importante che l'ago sia correttamente assemblato. L'assemblaggio improprio può causare la separazione dell'ago dalla siringa durante l'iniezione.



(1) Svitare con attenzione il cappuccio della siringa. (A)
(2) Afferrare delicatamente la parte stretta della protezione dell'ago; montare l'ago sull'adattatore Luer-Lock (B) in senso orario fino a sentire contro-pressione. Afferrare saldamente la parte più ampia della protezione dell'ago.
(3) Premere e ruotare la protezione dell'ago di 90° (un quarto di giro). Il quarto di giro è necessario per bloccare l'ago nella siringa.
(4) Rimuovere la protezione dell'ago.
(5) Usare i pollice e l'indice per tenere saldamente il cilindro della siringa di vetro e l'adattatore Luer-Lock. Afferrare la protezione dell'ago con l'altra mano. Per facilitare il corretto montaggio, premere e ruotare saldamente.

Italiano

Descrizione
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sono gel trasparenti forniti in siringhe di vetro. Il prodotto è solo per uso singolo. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sono dispositivi medici sterili. Impianti riassorbibili dermici che contengono Ialuronato di sodio non reticolato e un complesso peptidico (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11).
Lo ialuronato di sodio è una sostanza biocompatibile di origine non animale. Il ruolo dello ialuronato di sodio consiste nel rilasciare il peptide nella pelle, stratarla trattenendo l'acqua e agire come elemento ammortizzante. Il complesso peptidico è costituito da 4 tipi di peptidi, vale a dire catene corte di aminoacidi legati da legami peptidici. Il complesso peptidico migliora l'effetto idratante, migliora il contorno di spostiche area pelle riducendo l'accumulo di liquidi, migliora l'elasticità della pelle e ritarda la degradazione. Il complesso di peptidi con acido ialuronico si degrada entro 4 settimane. Ogni scatola contiene 2x1 siringa preriempita (2 ml di Prostrolane Inner_B) e 2 etichette di tracciabilità (una da consegnare al paziente e una per il medico da custodire nella cartella del paziente).

Composizione
PBS (Phosphate Buffered Saline), acido ialuronico (0.7%), complesso peptidico (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11)

Destinazione d'uso
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** è indicato per il trattamento del pordente del tessuto sottocutaneo causato da effetti chimici, fisici e traumatici, come la irregolarità della superficie dermica, specificamente formulato per ridurre la adiposità localizzata.

- Sito di applicazione
Viso, addome, glutei, parte posteriore delle cosce
- Volume di utilizzo consigliato:
Viso : 4ml/area (Massimo: 12ml/area) Addome, glutei, parte posteriore delle cosce: 10 ml/area (massimo: 20 ml/area)
- Frequenza:
1 sessione/2 settimane (1 protocollo = 4 – 6 sessioni in media), ripetere il protocollo se necessario)

Procedura di trattamento
Linee guida pre-trattamento
Prima del trattamento, il paziente deve evitare l'assunzione di aspirina, farmaci anti-infiammatori non steroidei, erba di San Giovanni o alte dosi di integratori di vitamina E. Questi agenti possono aumentare lividi e sanguinamento nel sito di trattamento.
1. È necessario consigliare il paziente e discutere le indicazioni adeguate, rischi, benefici e le risposte attese del trattamento con Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**. Informare il paziente delle precauzioni necessarie prima di iniziare la procedura.
2. Valutare le esigenze del paziente per un appropriato trattamento anestetico per la gestione del comfort, cioè anestetico locale, blocco locale o nervoso.
3. La area del paziente da trattare devono essere lavate con acqua e sapone e asciugate con un asciugamano pulito. Pulire la zona da trattare con alcol o altra soluzione antisettica adatta.
4. Si raccomanda l'uso di guanti sterili durante l'uso di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**.
5. Prima del trattamento, premere con attenzione lo stantuffo fino a quando una piccola goccia è visibile sulla punta.
6. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sono somministrati utilizzando un ago sterile sottile (27G x 13mm o 30G x 13mm). L'ago sterile viene inserito con un angolo approssimativo di 90° rispetto al sito di iniezione. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** devono essere iniettati in profondità nel derma.
7. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** non deve essere iniettato troppo superficialmente, questo può causare grumi visibili e / o scolorimento bluastro.
8. Iniettare Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** applicando una pressione uniforme sullo stantuffo. È importante che l'iniezione venga interrotta appena prima che l'ago venga estratto dalla pelle per evitare che il materiale fuoriesca o rimanga troppo superficialmente nella pelle.
9. Il grado e la durata della correzione dipendono dal carattere del difetto trattato.
9. Utilizzo tipico per ciascuna sessione di trattamento è specifico per l'area di trattare.
10. Dopo il trattamento, applicare l'etichetta di tracciabilità sulla cartella clinica del paziente.

Indicazioni per il montaggio
Assemblaggio dell'ago 27G o 30G (ago ipodermico) alla siringa. Per un uso sicuro di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**, è importante che l'ago sia correttamente assemblato. L'assemblaggio improprio può causare la separazione dell'ago dalla siringa durante l'iniezione.

(1) Svitare con attenzione il cappuccio della siringa. (A)
(2) Afferrare delicatamente la parte stretta della protezione dell'ago; montare l'ago sull'adattatore Luer-Lock (B) in senso orario fino a sentire contro-pressione. Afferrare saldamente la parte più ampia della protezione dell'ago.
(3) Premere e ruotare la protezione dell'ago di 90° (un quarto di giro). Il quarto di giro è necessario per bloccare l'ago nella siringa.
(4) Rimuovere la protezione dell'ago.
(5) Usare i pollice e l'indice per tenere saldamente il cilindro della siringa di vetro e l'adattatore Luer-Lock. Afferrare la protezione dell'ago con l'altra mano. Per facilitare il corretto montaggio, premere e ruotare saldamente.

German

Contraindicationi
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** non devono essere usati:
- in abbinamento con peeling, trattamento laser o ultrasuoni,
- se il paziente ha disturbi cutanei, infiammazioni o infezioni nel sito di trattamento o vicino a questo sito,
- nel caso di pazienti con nota ipersensibilità all'acido ialuronico, con anamnesi di grave allergia o shock anafilattico,
- nel caso dei pazienti con malattie autoimmuni,
- a causa di possibili interazioni con altri impianti di riempimento, che non sono stato studiate, è sconsigliabile utilizzare Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** in siti in presenza di altri impianti di riempimento,
- in gravidanza, in allattamento e in bambini o in soggetti di età inferiore ai 18 anni,
- per i pazienti con disturbi emorragici, con disturbi del colore della pelle.

Avvertenze ed eventi avversi
• Evitare di applicare prodotti per la cura della pelle diversi da quelli consigliati dal medico.
• Il medico deve informare i pazienti di possibili reazioni locali correlate all'impianto di questo dispositivo riassorbibile.
• Se una reazione infiammatoria o qualsiasi altro effetto collaterale non scompare entro una settimana, il paziente deve informare immediatamente il medico.
• Il medico è tenuto a segnalare qualsiasi effetto collaterale rilevante correlato a Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** a Caregen Co., Ltd.
attraverso il sito Web www.caregen.co.kr o via fax al numero + 82-31-462-3899.
• Rivolare l'uso di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** in siti specifici in cui è presente un'infezione infiammatoria o cistica o quando sono presenti lesioni cutanee o eruzioni cutanee.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sono confezionati per uso su singolo paziente. Non risterilizzare. Non usare se la confezione è aperta o danneggiata.
• Non usare Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** non devono essere miscelati con altri prodotti prima dell'impianto del dispositivo.
• Non iniettare nei vasi sanguigni.
• Non iniettare nelle pergolas superiori.

Precauzioni
• In caso di rischio allergico, un test deve essere fatto prima della prima iniezione. I risultati del test devono essere allegati alla cartella clinica del paziente.
• Gli operatori sanitari sono incoraggiati a discutere tutti i potenziali effetti collaterali con i pazienti prima del trattamento e assicurarsi che i pazienti siano a conoscenza di segni e sintomi di potenziali complicazioni.
• Altre 6 ridurre al minimo i rischi di potenziali complicazioni, il prodotto deve essere utilizzato solo da operatori sanitari che hanno una formazione, esperienza e conoscenza adeguate dell'anatomia in corrispondenza e intorno al sito di iniezione.
• Come con tutte le procedure iniettabili, l'impianto di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** comporta un rischio di infezione. Devono essere osservate le precauzioni standard per la materiali materiali.
• L'iniezione di Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** può causare ipersensibilità nel sito di iniezione.
• LVAS o sanguinamento possono verificarsi nel sito di iniezione.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sono gel trasparenti senza particolato. Nel caso in cui il contenuto di una siringa mostri segni di essenzione e / o capacità torbida, non usare la siringa. Il vetro è soggetto a rottura in una varietà di condizioni inevitabili. Prestare attenzione con la manipolazione della siringa di vetro e con lo smaltimento di vetro rotto per evitare lesioni da taglio.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** non deve essere iniettato in aree con attività prima dell'impianto del dispositivo.
• I pazienti devono informazioni l'esposizione dell'area trattata ed esposizione eccessiva al sole, esposizione alle lampade UV e condizioni climatiche estreme, almeno fino a quando non si riscontra il gonfiore e gli arrossamenti iniziali.
• Dopo l'uso, le siringhe e gli aghi devono essere maneggiati come potenziali rischi biologici. Lo smaltimento deve essere conforme alla pratica medica accettata e ai requisiti di legge secondo le normative vigenti locali e nazionali applicabili.

Condizioni di conservazione
Conservare tra i 2 °C ~ 25 °C. Proteggere dal gelo e dalla luce del sole. Assicurarsi che non vi siano segni visibili di danni alla confezione prima dell'uso.

Periodo di validità
2 anni in condizioni raccomandate.

(1) Schrauben Sie die Spitzenkappe der Spritze vorsichtig ab. (A)
(2) Fassen Sie den schmalen Teil des Nadelschutzes locker an. Bringen Sie die Nadel am Luer-Lock (B) an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Fassen Sie den breiteren Teil des Nadelschutzes fest an.
(3) Drücken und drehen Sie den Nadelschutz um 90° (eine vierte Umdrehung). Die Verriegelung ist erforderlich, um die Nadel an die Spritze zu befestigen.
(4) Ziehen Sie den Nadelschutz ab.
(5) Halten Sie Daumen und Zeigefinger fest um den Glasspritzenkörper und den Luer-Lock-Adapter. Fassen Sie den Nadelschutz mit der anderen Hand. Um die ordnungsgemäße Anbringung zu erleichtern, drücken und drehen Sie fest.

Kontraindikationen
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** dürfen in folgenden Fällen nicht verwendet werden:
- bei der Kombination mit Peeling, Laserbehandlung oder Ultraschall,
- bei Patienten mit Hauterkrankungen, Entzündungen oder Infektionen an der Behandlungsstelle oder in der Nähe dieser Stelle,
- bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure sowie mit schwerer Allergie oder anaphylaktischem Schock in der Vorgeschichte,
- bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen,
- Aufgrund möglicher Wechselwirkungen mit anderen Füllungsmaterialen, die nicht untersucht wurden, ist es nicht ratsam, Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** in Gegenwart anderer Füllungsmaterialien zu injizieren.
- bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern, Kindern oder Minderjährigen unter 18 Jahren,
- bei Patienten mit Blutungsstörungen, Hautfarbstörungen.

Warnungen und unerwünschte Ereignisse
• Vermeiden Sie die Anwendung von Hautpflegeprodukten, die nicht vom Arzt empfohlen wurden.
• Der Arzt muss den Patienten über mögliche lokale Reaktionen im Zusammenhang mit der Implantation dieses resorbierbaren Gerätes informieren.
• Sollte eine Entzündungsreaktion oder eine andere Nebenwirkung nicht innerhalb einer Woche verschwinden, muss der Patient den Arzt unverzüglich darüber informieren.
• Der Arzt wird gebeten, Caregen Co., Ltd. über die Webseite www.caregen.co.kr per Fax unter 82-31-462-3899 alle nennenswerten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** zu melden.
• Verschieben Sie die Verwendung von Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** an bestimmten Stellen, an denen ein aktiver Entzündungsprozess (Nahrungsaufnahme wie Zysten, Pickel, Hautausschläge oder Nesselsucht) oder eine Infektion vorliegt, bis der Prozess kontrolliert wurde.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sind für den einmaligen Gebrauch durch Patienten konzipiert. Nicht resterilisieren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
• Verwenden Sie Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums anwenden.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sollten vor der Implantation des Geräts mit keinen anderen Produkten gemischt werden.
• Nicht in Blutgefäße injizieren.
• Nicht in das obere Hautgewebe injizieren.

Vorsichtsmaßnahmen
• Bei allergischem Risiko sollte vor der ersten Injektion ein Test durchgeführt werden. Die Testergebnisse müssen der Krankenakte des Patienten beigefügt werden.
• Medizinische Fachkräfte werden aufgefordert, alle potenziellen Nebenwirkungen vor der Behandlung mit ihren Patienten zu besprechen und sicherzustellen, dass die Patienten Anzeichen und Symptome möglicher Komplikationen kennen.
• Um das Risiko potenzieller Komplikationen zu minimieren, sollte das Produkt nur von praktizierten Ärzten verwendet werden, die über eine angemessene Ausbildung und Erfahrung verfügen und sich mit der Anatomie an und um die Injektionsstelle auskennen.
• Wie bei allen Verfahren beim Eingriffen liegt die Implantation von Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** ein Infektionsrisiko. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für injizierbare Materialien sollten befolgt werden.
• Die Injektion von Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** kann zu einer Hypersprembildung an der Injektionsstelle führen.
• An der Injektionsstelle können Blutergüsse oder Blutungen auftreten.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sind ein transparentes Gel ohne Partikel. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn der Inhalt Anzeichen von Ausfällung oder trübe erscheint.
Unter verschiedenen unvermeidbaren Bedingungen kann es zu Glasbruch kommen. Beim Umgang mit der Glasspritze und beim Entsorgen von Glasscherben ist Vorsicht geboten, um Schnittverletzungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
• Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sollten vor der Implantation des Geräts mit keinen anderen Produkten gemischt werden.
Die Patienten sollten die Exposition des behandelten Bereichs gegenüber intensivem Sonnenlicht, UV-Lampenbehandlung und extremer Kälte mindestens so lange minimieren, bis eine anfängliche Schwellung und Rötung nachgelassen hat.
• Nach dem Gebrauch sollten Spritzen und Nadeln als potenzielle biologische Gefahrstoffe behandelt werden. Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den anerkannten medizinischen Praktiken und den geltenden lokalen, nationalen Anforderungen erfolgen.

Lagerbedingungen
Zwischen 2 °C und 25 °C lagern. Vor Frost und Sonnenlicht schützen.
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Verpackung keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Haltbarkeit
2 Jahre unter empfohlenen Bedingungen.

French

Description
Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sont des gels transparents fournis dans une seringue en verre. Le produit est à usage unique. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sont des dispositifs médicaux stériles. Implants dermiques résorbables, le produit contient de l'hyaluronate de sodium non réticulé et un complexe peptidique (Nonexpacidic-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11).
L'hyaluronate de sodium est un matériau d'origine non animale biocompatible. Le rôle de l'hyaluronate de sodium sur la peau est de délivrer du peptide, hydrater en retenant l'eau dans la peau ; agir comme un agent amortissant.
Le complexe peptidique se compose de 4 types de peptides à courte chaîne d'acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Le rôle du complexe peptidique est de renforcer l'effet hydratant, améliorer l'apparence de la peau, photo-vieillie et retarder la dégradation de l'hyaluronate de sodium.
L'hyaluronate de sodium avec complexe peptidique est dégradable en 4 semaines. Chaque boîte contient 2x1 seringue préremplie (2 ml pour Prostrolane Inner_B ou 1 ml pour Prostrolane Inner_B**®**) et deux étiquettes de traçabilité (une à remettre au patient ; l'autre à conserver par le médecin dans le dossier du patient).

Composition
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), hyaluronate de sodium (0,7%), complexe peptidique (nonexpacide 32, pentapeptide-43, tripeptide-41, octapeptide-11)

Indications
Spécialement formulé pour supprimer la cellulite cutanée. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sont indiqués pour traiter les lésions tissulaires sous-cutanées causées par des effets chimiques, physiques, traumatiques, les ramollissements et irrégularités de la surface cutanée.
- Zones d'applications : visage, abdomen, fesses, arrière des cuisses.
- Volume d'utilisation recommandé : Visage : 4 ml / zone (utilisation maximale : 12 ml / zone) - Abdomen, fesses, arrière des cuisses : 10 ml / zone (utilisation maximale : 20 ml / zone).
- Fréquence : 1 séance / 2 semaines (1 protocole = 4 – 6 séances en moyenne) répéter le protocole autant que nécessaire).

Procédure de traitement
Directives de prétraitement
Avant le traitement, le patient doit éviter de prendre de l'aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, du millepertuis ou de fortes doses de suppléments de vitamine E. Ces agents peuvent augmenter les ecchymoses et les saignements dans la zone de traitement.
1. Il est nécessaire de conseiller le patient et de discuter de l'indication appropriée, risques, bénéfices et réponses attendues d'un traitement Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**. Aviser le patient des précautions nécessaires avant de commencer la procédure.
2. Afin de prendre en compte le confort du patient, évaluer le besoin d'un traitement anesthésique approprié (anesthésie topique, locale ou nerveuse).
3. Laver la zone du patient à traiter à l'eau et au savon puis sécher avec une serviette propre. Nettoyez la zone à traiter avec de l'alcool ou une autre solution antiseptique appropriée.
4. Des gants stériles sont recommandés lors de l'utilisation de Prostrolane Inner_B / Inner_B**®**.
5. Avant le traitement, appuyez soigneusement sur la tige jusqu'à ce qu'une petite gouttelette soit visible à l'extrémité.
6. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sont administrés à l'aide d'une aiguille fine (27G x 13mm ou 30G x 13mm) stérilisée. L'aiguille stérilisée est insérée perpendiculairement à la longueur de la zone injectée à un angle d'environ 90 °. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** doivent être injectés profondément dans le derme.
7. Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** sont injectés trop superficiellement, cela peut entraîner des grumeaux visibles et/ou une décoloration bleuâtre.
8. Injectez Prostrolane Inner_B / Inner_B**®** en appliquant une pression uniforme sur la tige du piston. Il est important que l'injection soit arrêtée juste avant que l'aiguille ne soit retirée de la peau pour éviter que le produit ne s'